CÁNCER DE OVARIO

Se forma en los ovarios (órganos reproductivos femeninos donde se forman los óvulos y se producen las hormonas femeninas). El tipo más frecuente de cáncer de ovario es el epitelial, que representa aproximadamente un 90% de los tumores primarios de ovario.

FRECUENCIA DEL CÁNCER DE OVARIO

El cáncer de ovario es el 7mo tipo de cáncer más frecuente y la 7mo causa de muerte relacionada con el cáncer entre las mujeres en todo el mundo. La mitad de las mujeres a las que se les diagnostica cáncer de ovario tienen 60 años o más de edad. Pero puede aparecer en mujeres jóvenes.

CAUSAS DE CÁNCER DE OVARIO

Hasta el momento, se desconocen las causas del cáncer de ovario.

Factores de riesgo de cáncer de ovario son:

- La edad. La edad media de las mujeres a las que se les diagnostica cáncer de ovario es de unos 60 años. La incidencia disminuye ligeramente después de los 80 años.
- Los antecedentes familiares de cáncer de ovario o de mama son otro factor de riesgo para desarrollar cáncer de ovario. Esto se explica porque hasta un 10% de las pacientes con cáncer de ovario lo han heredado.
-Raza. Las mujeres de raza blanca tienen entre un 30% y un 40% más de riesgo de desarrollar cáncer de ovario que las mujeres de raza negra o hispánica.

DIAGNOSTICO DE CÁNCER DE OVARIO

El cáncer de ovario puede diagnosticarse durante una exploración física de rutina.
Los principales síntomas de cáncer de ovario están relacionados con la presencia de una masa en el abdomen y pueden incluir:
Molestias, presión o dolor en la zona de la pelvis o la zona abdominal.

- Sensación de saciedad o hinchazón abdominal.
- Cambios en los hábitos intestinales (por ejemplo, estreñimiento).
- Cambios en el patrón de micción, por ejemplo, una mayor frecuencia.
- Dolor durante las relaciones sexuales.

Estos síntomas, no obstante, no son específicos del cáncer de ovario y también se pueden observar en varias afecciones no malignas

El diagnóstico de cáncer de ovario se basa en las exploraciones o Examen clínico Exploración clínica de la pelvis.

- Investigación radiológica
  - Ecografía transvaginal, Resonancia magnética(RM)
  - Tomografía por emisión de positrones con tomografía
  - Marcadores tumorales.

Tratamiento:
Resección quirúrgica del tumor y los órganos + Quimioterapia adyuvante

Dra: Gladys Huerta, residente Hospital Domingo Luciani Servicio de Endocrinología